



โรคติดต่อไวรัสซิกา ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดต่อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกึ่ง, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์


อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 - 7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อนให้เพียงพอ



2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินแอสไพริน

การป้องกัน



1 เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง



2 เก็บขยะ ดัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย



3 เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน

➤ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ ◀

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค